Fonctions : limites, continuité, dérivabilité.

Correction 1

1. Réponse b.

Il y a deux solutions à cette équation :

- L'image de l'intervalle $[0; 2]$ est :

$$f([0; 2]) = [-5; 4]$$

De plus, f est strictement croissante sur cet intervalle ; on en déduit que la valeur -2 est atteinte une fois.

- L'image de l'intervalle $[2; +\infty[$ est :

$$f([2; +\infty[) =]-4, 5; 4]$$

La fonction f est strictement décroissante sur cet intervalle ; on en déduit que la valeur -2 est atteinte une fois.

2. Réponse b.

Le tableau de variation montre que la fonction atteint son maximum 4 pour la valeur $x=2$.

La fonction f n'admet pas de maximum mais deux maximums locaux ; le maximum d'une fonction doit être global sur son ensemble de définition.

3. Réponse a.

La fonction f admet un maximum en 2 ; la fonction étant dérivable en 2, on en déduit la valeur suivante du nombre dérivée :

$$f'(2) = 0$$

La courbe $\mathcal{C}$ admet pour tangente au point d'abscisse 2, la droite d'équation :

$$y = f'(2) \cdot (x - 2) + f(2)$$

$$y = 0 \cdot (x - 2) + 4$$

$$y = 4$$

Correction 2

a. L'expression $3x^2+4x+1$ a pour discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4^2 - 4 \times 3 \times 1 = 16 - 12 = 4$$

On a la simplification : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{4} = 2$

Le discriminant étant strictement positif, cette expression admet les deux racines suivantes :

$$\begin{array}{l|l} x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} & x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \\ = \frac{-4 - 2}{2 \times 3} & = \frac{-4 + 2}{2 \times 3} \\ = \frac{-6}{6} & = \frac{-2}{6} \\ = -1 & = -\frac{1}{3} \end{array}$$

On a la factorisation suivante :

$$3x^2 + 4x - 1 = 3 \left[x - \left(-\frac{1}{3} \right) \right] [x - (-1)]$$

$$= 3 \left(x + \frac{1}{3} \right) (x + 1) = 3(3x + 1)(x + 1)$$

b. L'expression $-3x^2+4x-1$ a pour discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4^2 - 4 \times (-3) \times (-1) = 16 - 12 = 4$$

On a la simplification : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{4} = 2$

Le discriminant étant strictement positif, cette expression admet les deux racines suivantes :

$$\begin{array}{l|l} x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} & x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \\ = \frac{-4 - 2}{2 \times (-3)} & = \frac{-4 + 2}{2 \times (-3)} \\ = \frac{-6}{-6} & = \frac{-2}{-6} \\ = 1 & = \frac{1}{3} \end{array}$$

On a la factorisation suivante :

$$\begin{aligned} -3x^2 + 4x - 1 &= (-3) \left(x - \frac{1}{3} \right) (x - 1) \\ &= (-3x + 1)(x - 1) \end{aligned}$$

c. L'expression $-4x^2+5x$ admet la factorisation :

$$-4x^2 + 5x = x(-4x + 5)$$

Il était également possible de calculer le discriminant de cette expression puis de rechercher les deux racines pour obtenir la même forme factorisée.

d. L'expression x^2+2x-1 a pour discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4ac = 2^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 4 + 4 = 8$$

On a la simplification : $\sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = 2\sqrt{2}$

Le discriminant étant strictement positif, cette expression admet les deux racines :

$$\begin{array}{l|l} x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} & x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \\ = \frac{-2 - 2\sqrt{2}}{2 \times 1} & = \frac{-2 + 2\sqrt{2}}{2 \times 1} \\ = \frac{-2 - 2\sqrt{2}}{2} & = \frac{-2 + 2\sqrt{2}}{2} \\ = -1 - \sqrt{2} & = -1 + \sqrt{2} \end{array}$$

On a la factorisation suivante :

$$\begin{aligned} x^2 + 2x - 1 &= [x - (-1 - \sqrt{2})] [x - (-1 + \sqrt{2})] \\ &= (x + 1 + \sqrt{2})(x + 1 - \sqrt{2}) \end{aligned}$$

e. L'expression $-x^2+4x+1$ a pour discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4^2 - 4 \times (-1) \times 1 = 16 + 4 = 20$$

On a la simplification : $\sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5}$

Le discriminant étant strictement positif, cette expression admet les deux racines :

$$\begin{array}{l|l} x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} & x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \\ = \frac{-4 - 2\sqrt{5}}{2 \times (-1)} & = \frac{-4 + 2\sqrt{5}}{2 \times (-1)} \\ = \frac{-4 - 2\sqrt{5}}{-2} & = \frac{-4 + 2\sqrt{5}}{-2} \\ = 2 + \sqrt{5} & = 2 - \sqrt{5} \end{array}$$

On a la factorisation suivante :

$$\begin{aligned} -x^2 + 4x + 1 &= -[x - (2 + \sqrt{5})] [x - (2 - \sqrt{5})] \\ &= -(x - 2 - \sqrt{5})(x - 2 + \sqrt{5}) \end{aligned}$$

f. L'expression $3x^2-4x+2$ a pour discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \times 3 \times 2 = 16 - 24 = -8$$

Le discriminant étant strictement négatif, cette expression n'admet pas de racine : elle ne peut se factoriser en

produit de facteurs de premier degré.

Correction 3

a. On a les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x^2 - 3x + 5 = 3 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} x - 1 = 0^+$$

On en déduit la limite du quotient :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 3x + 5}{x + 1} = +\infty$$

b. On a les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} 5 - x = 4 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} 1 - x = 0^-$$

On en déduit la limite du quotient :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{5 - x}{1 - x} = -\infty$$

c. On a les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 + x + 1 = 1 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0^-$$

On en déduit la limite du quotient :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 + x + 1}{x} = -\infty$$

d. On a les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x - 1 = -1 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} -x^3 = 0^-$$

On en déduit la limite du quotient :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - 1}{-x^3} = +\infty$$

Correction 4

a. On a les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \cdot x^2 = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} 3 \cdot x = +\infty$$

On en déduit la limite suivante :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \cdot x^2 + 3 \cdot x = +\infty$$

b. On a les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -3 \cdot x^3 = -\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$$

On en déduit la limite suivante :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -3 \cdot x^2 + \frac{2}{x} = -\infty$$

c. On a les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 5 \cdot x^2 = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} -3 \cdot x^3 = +\infty$$

On en déduit la limite suivante :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 5 \cdot x^2 - 3 \cdot x^3 = +\infty$$

d. On a les transformations algébriques suivantes :

$$x^2 + 2x - (x + 2)^2 = x^2 + 2x - (x^2 + 4x + 4) \\ = x^2 + 2x - x^2 - 4x - 4 = -4x - 4$$

On a les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -4x = -\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} -2 = -2$$

On a en déduit la valeur de la limite :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + 2x - (x + 2)^2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} -4x - 2 = -\infty$$

e. On a la factorisation suivante :

$$x^2 + 3x = x \cdot (x + 3)$$

On a les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x + 3 = -\infty$$

On a en déduit la valeur de la limite :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + 3x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot (x + 3) = +\infty$$

f. On a les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} -2 \cdot x^2 = -\infty$$

On a en déduit la limite suivante :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 - 2 \cdot x^2 = -\infty$$

Correction 5

1. a. On a les transformations algébriques suivantes :

$$\frac{3x^2 + 5x}{3x^3 + 4x + 1} = \frac{x^2 \cdot \left(3 + \frac{5}{x}\right)}{x^3 \cdot \left(3 + \frac{4}{x^2} + \frac{1}{x^3}\right)} = \frac{3 + \frac{5}{x}}{x \cdot \left(3 + \frac{4}{x^2} + \frac{1}{x^3}\right)}$$

b. On a les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 3 + \frac{5}{x} = 3 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \left(3 + \frac{4}{x^2} + \frac{1}{x^3}\right) = +\infty$$

On en déduit la limite du quotient :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{5}{x}}{x \cdot \left(3 + \frac{4}{x^2} + \frac{1}{x^3}\right)} = 0$$

2. Pour $x \neq 0$, on a les transformations algébriques :

$$\frac{4x^3 + 2x + 1}{2x^3 - 2x^2} = \frac{x^3 \cdot \left(4 + \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^3}\right)}{x^3 \cdot \left(2 - \frac{2}{x}\right)} = \frac{4 + \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^3}}{2 - \frac{2}{x}}$$

On a les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 4 + \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^3} = 4 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 - \frac{2}{x} = 2$$

On a en déduit la limite de la fonction g en $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4 + \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^3}}{2 - \frac{2}{x}} = \frac{4}{2} = 2$$

Correction 6

1. Pour $x \neq 0$, on a les transformations algébriques :

$$\bullet f(x) = \frac{2x^3 - x}{x^3 + 2x^2} = \frac{x^3 \cdot \left(2 - \frac{x}{x^3}\right)}{x^3 \cdot \left(1 + \frac{2x^2}{x^3}\right)} = \frac{x^3 \cdot \left(2 - \frac{1}{x^2}\right)}{x^3 \cdot \left(1 + \frac{2}{x}\right)} = \frac{2 - \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{2}{x}}$$

$$\bullet f(x) = \frac{2x^3 - x}{x^3 + 2x^2} = \frac{x \cdot (2x^2 - 1)}{x \cdot (x^2 + 2x)} = \frac{2x^2 - 1}{x^2 + 2x} = \frac{2x^2 - 1}{x \cdot (x + 1)}$$

2. L'expression initiale de $f(x)$ représente une forme indéterminée pour les deux limites demandées. Il faut utiliser pour chacune des limites une des deux expressions proposées ne présentant de forme indéterminée pour la limite considérée :

• On a les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2 - \frac{1}{x^2} = 2 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{2}{x} = 1$$

On en déduit la limite suivante :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{2}{x}} = \frac{2}{1} = 2$$

• On a les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 2x^2 - 1 = -1 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot (x + 1) = 0^+$$

On en déduit la limite suivante :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x^2 - 1}{x \cdot (x + 1)} = -\infty$$

Correction 7

1. Le facteur $\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x+1}$ étant non-nul, à l'aide de l'expression conjuguée du dénominateur, on a les transformations algébriques suivantes :

$$\begin{aligned} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x+1}} &= \frac{x \cdot (\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x+1})}{(\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x+1})(\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x+1})} \\ &= \frac{x \cdot (\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x+1})}{(\sqrt{x^2+1})^2 - (\sqrt{x+1})^2} = \frac{x \cdot (\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x+1})}{(x^2+1) - (x+1)} \\ &= \frac{x \cdot (\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x+1})}{x^2+1-x-1} = \frac{x \cdot (\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x+1})}{x \cdot (x-1)} \\ &= \frac{\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x+1}}{x-1} \end{aligned}$$

2. On a les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x^2+1} + \sqrt{x+1} = 2 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x-1 = -1$$

On en déduit la limite du quotient :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x+1}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x+1}}{x-1} \\ &= \frac{2}{-1} = -2 \end{aligned}$$

Correction 8

a. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x\sqrt{x} - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x} - 1)$

Or, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} - 1 = +\infty$
 $= +\infty$

b. Au préalable, on remarque que 1 est une racine du dénominateur du second terme ; ce qui permet d'effectuer de tête la factorisation suivante :

$$x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2)$$

On a les transformations algébriques suivantes :

$$\begin{aligned} \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x^2+x-2} &= \frac{1}{x-1} - \frac{1}{(x-1)(x+2)} \\ &= \frac{x+2}{(x-1)(x+2)} - \frac{1}{(x-1)(x+2)} = \frac{x+1}{(x-1)(x+2)} \end{aligned}$$

Etudions le signe de ce quotient :

x	$-\infty$	-2	-1	1	$+\infty$
x+1	-	-	0	+	+
x-1	-	-	-	0	+
x+2	-	0	+	+	+
$\frac{x+1}{(x-1)(x+2)}$	-	+	0	-	+

Ainsi, d'après le tableau de signe, on peut affirmer que :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x^2+x-2} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{(x-1)(x+2)} \\ &= +\infty \end{aligned}$$

c. Le facteur $\sqrt{2x+2}$ est non-nul. On a :

$$\begin{aligned} \frac{x-2}{\sqrt{2x-2}} &= \frac{(x-2)(\sqrt{2x+2})}{(\sqrt{2x-2})(\sqrt{2x+2})} \\ &= \frac{(x-2)(\sqrt{2x+2})}{(\sqrt{2x})^2 - 2^2} = \frac{(x-2)(\sqrt{2x+2})}{2x-4} \\ &= \frac{(x-2)(\sqrt{2x+2})}{2(x-2)} = \frac{\sqrt{2x+2}}{2} = 2 \end{aligned}$$

On en déduit la limite :

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-2}{\sqrt{2x-2}} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\sqrt{2x+2}}{2} = 2$$

d. La limite étudiée étant en $-\infty$, considérons que x est strictement négatif :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^2-3x+1}{2x^2+x-2} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 \left(5 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2} \right)}{x^2 \left(2 + \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} \right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}}{2 + \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

Correction 9

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} x^2 &\geq 0 \\ x^2 + 1 &\geq 1 > 0 \\ x^2 + 1 &> 0 \end{aligned}$$

Ainsi, la racine de x^2+1 existe et vérifie :

$$\sqrt{x^2+1} > 0$$

Le dénominateur existant et étant non-nul sur $\mathbb{R}$, on en déduit que la fonction f est définie sur $\mathbb{R}$.

2. Pour $x \neq 0$, on a les transformations algébriques suivantes :

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{x \cdot \left(2 + \frac{1}{x} \right)}{\sqrt{x^2 \cdot \left(1 + \frac{1}{x^2} \right)}} = \frac{x \cdot \left(2 + \frac{1}{x} \right)}{\sqrt{x^2} \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} \\ &= \frac{x \cdot \left(2 + \frac{1}{x} \right)}{|x| \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} \end{aligned}$$

3. Etudions l'expression de la fonction f :

• au voisinage de $-\infty$:

$$f(x) = \frac{x \cdot \left(2 + \frac{1}{x} \right)}{|x| \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = \frac{x \cdot \left(2 + \frac{1}{x} \right)}{-x \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = \frac{2 + \frac{1}{x}}{-\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}}$$

On a les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 2 + \frac{1}{x} = 2 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} -\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = -1$$

On en déduit la limite suivante :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 + \frac{1}{x}}{-\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = \frac{2}{-1} = -2$$

• au voisinage de $+\infty$:

$$f(x) = \frac{x \cdot \left(2 + \frac{1}{x} \right)}{|x| \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = \frac{x \cdot \left(2 + \frac{1}{x} \right)}{x \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = \frac{2 + \frac{1}{x}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}}$$

On a les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2 + \frac{1}{x} = 2 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = 1$$

On en déduit la limite suivante :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \frac{1}{x}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = \frac{2}{1} = 2$$

Correction 10

1. L'encadrement suivant montre que le dénominateur de la fraction définissant f ne s'annule pas :

$$\begin{aligned} -1 &\leq \cos x \leq 1 \\ -1 &\leq -\cos x \leq 1 \\ 1 &\leq 2 - \cos x \leq 3 \end{aligned}$$

$$0 < x^2 + 1 \leq x^2 + 2 - \cos x \leq x^2 + 3$$

On en déduit que la fonction f est définie sur $\mathbb{R}$:

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$$

2. a. Reprenons l'encadrement précédent :

$$0 < x^2 + 1 \leq x^2 + 2 - \cos x \leq x^2 + 3$$

La fonction inverse est décroissante sur $\mathbb{R}_+$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^2 + 1} &\geq \frac{1}{x^2 + 2 - \cos x} \geq \frac{1}{x^2 + 3} \\ \frac{1}{x^2 + 3} &\leq \frac{1}{x^2 + 2 - \cos x} \leq \frac{1}{x^2 + 1} \\ \frac{5}{x^2 + 3} &\leq \frac{5}{x^2 + 2 - \cos x} \leq \frac{5}{x^2 + 1} \\ \frac{5}{x^2 + 3} &\leq f(x) \leq \frac{5}{x^2 + 1} \end{aligned}$$

On a les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x^2 + 1} = 0 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x^2 + 3} = 0$$

D'après le théorème des gendarmes, on a la valeur suivante de la limite :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

Correction 11

- a. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

La fonction f est la puissance 5-ième de la fonction $u(x)$ où :

$$u(x) = 3x + 5 \quad ; \quad u'(x) = 3$$

La formule de dérivation de la puissance d'une fonction donne l'expression de la fonction f :

$$f'(x) = 5 \cdot u'(x) \cdot [u(x)]^4 = 5 \times 3 \cdot (3x + 5)^4 = 15 \cdot (3x + 5)^4$$

- b. Le dénominateur étant toujours strictement positif, la fonction g est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

La fonction g est définie par l'inverse de la fonction u définie par :

$$u(x) = 3x^4 + 1 \quad ; \quad u'(x) = 12 \cdot x^3$$

La formule de dérivation de l'inverse d'une fonction permet d'obtenir l'expression de la fonction g' , dérivée de la fonction g :

$$g'(x) = -\frac{u'(x)}{[u(x)]^2} = -\frac{12 \cdot x^3}{(3x^4 + 1)^2}$$

- c. La fonction h est la composée de la fonction u par la fonction racine carrée où :

$$u(x) = x^2 + x + 1 \quad ; \quad u'(x) = 2x + 1$$

La formule de dérivation d'une fonction racine carrée permet d'obtenir la dérivée de h' :

$$h'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = \frac{2x + 1}{2\sqrt{x^2 + x + 1}}$$

- d. La fonction j est dérivable sur $\mathbb{R}_*^+$.

La fonction j est la composée de la fonction u par la fonction racine carrée où :

$$u(x) = \frac{1}{x} \quad ; \quad u'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

Ainsi, la formule de dérivation de la fonction racine carrée permet d'obtenir l'expression de la fonction j' :

$$j'(x) = \frac{u'(x)}{2 \cdot \sqrt{u(x)}} = \frac{-\frac{1}{x^2}}{2 \cdot \sqrt{\frac{1}{x}}} = -\frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{\frac{1}{x}}} = -\frac{1}{2x^2 \cdot \sqrt{\frac{1}{x}}}$$

Correction 12

1. Déterminons le signe du polynôme du second degré situé sous le radical. Ce polynôme a pour discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 13^2 - 4 \times 6 \times (-5) = 169 - (-120) = 289$$

On a la simplification : $\sqrt{289} = \sqrt{17^2} = 17$

Le discriminant étant strictement positif, ce polynôme admet les deux racines suivantes :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} & x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \\ &= \frac{-13 - 17}{2 \times 6} & &= \frac{-13 + 17}{2 \times 6} \\ &= \frac{-30}{12} & &= \frac{4}{12} \\ &= -\frac{5}{2} & &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Le coefficient du second degré étant strictement positif, on a le tableau de signe suivant :

x	$-\infty$	$-\frac{5}{2}$	$\frac{1}{3}$	$+\infty$	
$6x^2 + 13x - 5$	+	0	-	0	+

Une racine carrée n'étant définie que pour un nombre positif ou nul, on en déduit que l'image d'un nombre x par la fonction f ne peut exister que si l'expression sous le radical est positif ou nul. On en déduit l'ensemble de définition de la fonction f :

$$\mathcal{D}_f = I =]-\infty; -\frac{5}{2}] \cup \left[\frac{1}{3}; +\infty[$$

2. L'expression de la fonction f est donnée sous la forme de la composée d'une fonction u par la fonction racine carrée où :

$$u(x) = 6x^2 + 13x - 5 \quad ; \quad u'(x) = 12x + 13$$

Par la formule de la dérivée de la composée d'une fonction par la fonction racine carrée, on obtient l'expression de la fonction f' , dérivée de la fonction f :

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{2 \cdot \sqrt{u(x)}} = \frac{12x + 13}{2 \cdot \sqrt{6x^2 + 13x - 5}}$$

Ainsi, on a le tableau de signe suivant :

x	$-\infty$	$-\frac{5}{2}$	$-\frac{13}{12}$	$\frac{1}{3}$	$+\infty$
$12x + 13$	-	-	0	+	+
$2\sqrt{6x^2 + 13x - 5}$	+	0		0	+
$f'(x)$	-				+

Pour $x \neq 0$, on a les transformations algébriques :

$$f(x) = \sqrt{6x^2 + 13x - 5} = \sqrt{x^2 \cdot \left(6 + \frac{13}{x} - \frac{5}{x^2}\right)}$$

On a les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} 6 + \frac{13}{x} - \frac{5}{x^2} = 6$$

On en déduit la limite :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 \cdot \left(6 + \frac{13}{x} - \frac{5}{x^2}\right) = +\infty \implies \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

De même, on obtient la limite : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

Ainsi, la fonction f admet le tableau de variation suivant :

x	$-\infty$	$-\frac{5}{2}$	$\frac{1}{3}$	$+\infty$	
Variation de f	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Correction 13

1. a. L'expression placée sous le radical est toujours positive ; ainsi, la racine carrée est définie pour toute valeur réelle de x .

Pour que le quotient soit défini, il est nécessaire que son dénominateur soit non nul ; ainsi, l'image de 0 par la fonction f n'est pas définie.

Ainsi, l'ensemble de définition de la fonction f est :

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

- b. Le facteur $\sqrt{x^2+1}+1$ est non-nul. On a les transformations algébriques suivantes :

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} = \frac{(\sqrt{x^2+1}-1) \cdot (\sqrt{x^2+1}+1)}{x \cdot (\sqrt{x^2+1}+1)} \\ &= \frac{x^2+1-1^2}{x \cdot (\sqrt{x^2+1}+1)} = \frac{x^2}{x \cdot (\sqrt{x^2+1}+1)} \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2+1}+1} \end{aligned}$$

Ainsi, on a les deux limites suivantes :

- $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}+1} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}+1} = 0$

- c. La fonction n'est pas continue en 0 car elle n'est pas définie en 0.

2. La fonction g vérifie les trois conditions suivantes :

- Sur $\mathbb{R}_-^*$, on a l'égalité $g(x) = f(x)$; ainsi, on a la limite :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$$

- Sur $\mathbb{R}_+^*$, on a l'égalité $g(x) = f(x)$; ainsi, on a la limite :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

- Pour $x=0$, on a :
 $g(0) = f(0) = 0$

Correction 14

1. L'expression de la fonction f est donnée sous la forme :

$$f(x) = [u(x)]^n - 1 - n \cdot x$$

où la fonction u est définie par :

$$u(x) = 1+x \quad ; \quad u'(x) = 1$$

La formule de dérivation de la puissance $n^{\text{ième}}$ d'une fonction permet d'obtenir l'expression de la fonction f' :

$$\begin{aligned} f'(x) &= n \cdot u'(x) \cdot [u(x)]^{n-1} = n \times 1 \cdot (1+x)^{n-1} - 0 - n \\ &= n(1+x)^{n-1} - n = n \cdot [(1+x)^{n-1} - 1] \end{aligned}$$

Etudions le signe de la fonction f' dérivée de la fonction f . On a les comparaisons suivantes :

$$x \geq 0$$

$$1+x \geq 1$$

$$(1+x)^n \geq 1^n$$

$$(1+x)^n \geq 1$$

$$(1+x)^n - 1 \geq 0$$

$$n \cdot [(1+x)^n - 1] \geq n \times 0$$

$$f'(x) \geq 0$$

La fonction f' étant positive sur $\mathbb{R}_+$, on en déduit que la fonction f est croissante sur $\mathbb{R}_+$.

2. En remarquant :

$$f(0) = (1+0)^n - 1 - 0 \times 0 = 1^n - 1 - 0 = 1 - 1 = 0$$

On obtient le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $\mathbb{R}_+$:

x	0	$+\infty$
Variation de f	0	$\nearrow$

On en déduit que la fonction f est positive ou nulle sur $\mathbb{R}$. Pour tout nombre x appartenant à $\mathbb{R}_+$, on a la comparaison :

$$f(x) \geq 0$$

$$(1+x)^n - 1 - n \cdot x \geq 0$$

$$(1+x)^n \geq 1 + n \cdot x$$

Correction 15

1. • La fonction f peut être écrite sous la forme :

$$f(x) = x - 1 + 2 \times \frac{1}{u(x)}$$

où la fonction u est définie par :

$$u(x) = x^2 + 1 \quad ; \quad u'(x) = 2x$$

La formule de dérivation de la composée d'une fonction par la fonction inverse donne l'expression de la fonction f' :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 + 2 \times \left[-\frac{u'(x)}{[u(x)]^2} \right] \\ &= 1 + 2 \times \left[-\frac{2x}{(x^2+1)^2} \right] = 1 - \frac{4x}{(x^2+1)^2} \end{aligned}$$

- L'expression de la fonction f' est donnée sous la forme :

$$f'(x) = 1 - \frac{u(x)}{v(x)}$$

où les fonctions u et v sont définies par :

$$u(x) = 4x \quad ; \quad v(x) = (x^2+1)^2$$

qui admettent pour dérivées :

$$\Rightarrow u'(x) = 4$$

- L'expression de la fonction v est définie par le carré de la fonction w où :

$$w(x) = x^2 + 1 \quad ; \quad w'(x) = 2x$$

La formule de dérivation de la puissance n -ième d'une fonction donne :

$$v'(x) = 2 \times w'(x) \cdot w(x) = 2 \times (2x) \cdot (x^2+1)$$

$$= 4x \cdot (x^2+1)$$

La formule de dérivation du quotient permet d'obtenir l'expression de la fonction f' :

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= 0 - \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2} \\
 &= 0 - \frac{4 \cdot (x^2 + 1)^2 - 4x \cdot [4x \cdot (x^2 + 1)]}{[(x^2 + 1)^2]^2} \\
 &= 0 - \frac{4 \cdot (x^2 + 1)^2 - 16x^2 \cdot (x^2 + 1)}{(x^2 + 1)^4} \\
 &= -\frac{(x^2 + 1)[4 \cdot (x^2 + 1) - 16x^2]}{(x^2 + 1)^4} \\
 &= -\frac{4 \cdot (x^2 + 1) - 16x^2}{(x^2 + 1)^3} = -\frac{4x^2 + 4 - 16x^2}{(x^2 + 1)^3} \\
 &= -\frac{4 - 12x^2}{(x^2 + 1)^3} = \frac{12x^2 - 4}{(x^2 + 1)^3}
 \end{aligned}$$

2. a. Le polynôme $12x^2 - 4$ admet la factorisation :
 $12x^2 - 4 = 4 \cdot (3x^2 - 1) = 4 \cdot (\sqrt{3} \cdot x + 1)(\sqrt{3} \cdot x - 1)$

Ce polynôme admet les deux racines $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ et $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Le numérateur du quotient définissant la fonction f'' est un polynôme du second degré dont le coefficient du terme du second degré est positif.

On a le tableau de signe de la fonction f'' :

x	$-\infty$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$+\infty$	
$12x^2 - 4$	+	0	-	0	+
$f''(x)$	+	0	-	0	+

b. On a les deux valeurs approchées des deux images suivantes :

$$f'\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \simeq 2,3 \quad ; \quad f'\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \simeq -0,3$$

On a la transformation algébrique suivante :

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= 1 - \frac{4 \cdot x}{(x^2 + 1)^2} = 1 - \frac{4 \cdot x}{\left[x^2 \cdot \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)\right]^2} \\
 &= 1 - \frac{4 \cdot x}{x^4 \cdot \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^2} = 1 - \frac{4}{x^3 \cdot \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^2}
 \end{aligned}$$

qui permet d'obtenir les deux limites suivantes :

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 1 - \frac{4}{x^3 \cdot \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^2} = 1$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{4}{x^3 \cdot \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^2} = 1$$

On obtient le tableau de valeur suivant :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$+\infty$
Variation de f'	1	$1 + \frac{9}{4\sqrt{3}}$	$1 - \frac{9}{4\sqrt{3}}$	1

3. a. Etudions l'équation $f'(x) = 0$ sur les trois intervalles suivants :

• Sur l'intervalle $]-\infty; -\frac{\sqrt{3}}{3}[$:

La fonction f' admet un minimum valant 1 : la fonction f' ne s'annule pas sur ce minimum.

• Sur l'intervalle $[-\frac{\sqrt{3}}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3}]$:

On a les deux images aux bornes de cet intervalle :

$$f'\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \simeq 2,3 \quad ; \quad f'\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \simeq -0,3$$

De plus :

⇒ la fonction f' est continue sur $[-\frac{\sqrt{3}}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3}]$

⇒ la fonction f' est strictement décroissante sur $[-\frac{\sqrt{3}}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3}]$

⇒ le nombre 0 est compris entre les images des bornes de cet intervalle.

D'après le corollaire des valeurs intermédiaire, il existe, une unique valeur $\alpha \in [-\frac{\sqrt{3}}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3}]$ vérifiant :

$$f'(\alpha) = 0$$

De plus, des valeurs approchées des images suivantes :

$$f'(0,2) \simeq 0,26 > 0 \quad ; \quad f'(0,3) \simeq -0,01 < 0$$

la fonction f' étant continue et changeant de signe sur $[0,2; 0,3]$, on en déduit :

$$\alpha \in [0,2; 0,3]$$

• Sur l'intervalle $[\frac{\sqrt{3}}{3}; +\infty[$:

On a les limites aux bornes de l'intervalle :

$$f'\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \simeq -0,3 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty.$$

De plus :

⇒ la fonction f' est continue sur $[\frac{\sqrt{3}}{3}; +\infty[$

⇒ la fonction f' est strictement croissante sur $[\frac{\sqrt{3}}{3}; +\infty[$

⇒ le nombre 0 est compris entre les limites aux bornes de cet intervalle.

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe, une unique valeur $\beta \in [\frac{\sqrt{3}}{3}; +\infty[$.

En observant que $f'(1) = 0$, on en déduit : $\beta = 1$

b. Ainsi, la fonction f' admet le tableau de signe suivant :

x	$-\infty$	α	1	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+

4. a. On a les deux limites suivantes :

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} x - 1 + \frac{2}{x^2 + 1} = -\infty$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} x - 1 + \frac{2}{x^2 + 1} = +\infty$$

Ainsi, on obtient le tableau de variation suivant :

x	$-\infty$	α	1	$+\infty$
Variation de f	$-\infty$	$f(\alpha) \simeq 1,13$	1	$+\infty$